

Ротавіт Кальціум Форте

Інструкція щодо застосування (скорочено)

Інформація для споживача

Дієтична добавка.

Не є лікарським засобом. Без ГМО

Склад.

таблетка шипуча містить

основні речовини:

- кальцій (у формі 2670 мг кальцію карбонату) – 1000 мг;
- вітамін D₃ (холекальциферол) – 880 МО;

допоміжні речовини: лимонна кислота безводна (*регулятор кислотності*); мальтодекстрин; сорбіт (*наповнювач*); підсолоджувачі: аспартам, ацесульфам калію; ароматизатор натуральний «Апельсин»; кислота яблучна; поліетиленгліколь 6000; модифікований харчовий крохмаль; цукроза; натрію аскорбат кристалічний; тригліцериди середнього ланцюга; кремнію діоксид (*наповнювач*); DL-альфа-токоферол (*стабілізатор*).

Функціональні властивості складових компонентів.

Кальцій бере участь у формуванні кісткової тканини, регулюванні артеріального тиску і процесі згортання крові. Сприяє формуванню кісток, зубів, підвищенню щільності кісткової тканини, підтримці здорового стану шкіри. При недостатньому надходженні кальцію зовні кісткова тканина виконує функцію депо, за допомогою якого організм забезпечує нормальний рівень кальціємії. Застосування кальцію зменшує ризик розвитку остеопорозу. Сприяє нормальному функціонуванню нервової і м'язової систем.

Нестача *вітаміну D* спостерігається при обмеженні експозиції сонячного світла, нестачі вітаміну D в харчуванні (дієта з пониженим вмістом м'яса, печінки, рибних продуктів), порушеннях всмоктування і жовчовиділення.

Вітамін D₃ регулює обмін кальцію і фосфору в організмі, бере участь у формуванні кісткового скелета, сприяє збереженню структури кісток, підвищує абсорбцію кальцію та солей фосфорної кислоти в кишечнику, а також регулює процес їх виведення, активує відкладення кальцію в кістках та протидіє резорбції, збільшує щільність кісткової тканини.

Вітамін D₃ необхідний для нормального функціонування паращитовидної залози, регулює разом з гормоном паращитовидної залози концентрацію іонів кальцію в крові.

Кальцій бере участь у формуванні кісткової тканини, регулюванні артеріального тиску і процесі згортання крові. Сприяє формуванню кісток, зубів, підвищенню щільності кісткової тканини, підтримці здорового стану шкіри. При недостатньому надходженні кальцію зовні кісткова тканина виконує функцію депо, за допомогою якого організм забезпечує нормальний рівень кальціємії. Застосування кальцію зменшує ризик розвитку остеопорозу. Сприяє нормальному функціонуванню нервової і м'язової систем.

Нестача *вітаміну D* спостерігається при обмеженні експозиції сонячного світла, нестачі вітаміну D в харчуванні (дієта з пониженим вмістом м'яса, печінки, рибних продуктів), порушеннях всмоктування і жовчовиділення.

Вітамін D₃ регулює обмін кальцію і фосфору в організмі, бере участь у формуванні кісткового скелета, сприяє збереженню структури кісток, підвищує абсорбцію кальцію та солей фосфорної кислоти в кишечнику, а також регулює процес їх виведення, активує відкладення кальцію в кістках та протидіє резорбції, збільшує щільність кісткової тканини.

Вітамін D₃ необхідний для нормального функціонування паращитовидної залози, регулює разом з гормоном паращитовидної залози концентрацію іонів кальцію в крові.

Рекомендації щодо застосування.

Рекомендується у якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело кальцію та вітаміну D з метою покращення регенерації хрящової тканини, усунення дефіциту кальцію та вітаміну

Спосіб застосування та рекомендована добова доза.

Незалежно від прийому їжі *дорослим та дітям віком від 12 років і старше* – вживати по 1 таблетці на добу.

Перед вживанням таблетку необхідно розчинити у склянці (200 мл) питної води кімнатної температури, розмішати і випити відразу після приготування.

Курс споживання становить 4-6 тижнів.

Кількість курсів споживання визначається індивідуально.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Застереження щодо застосування.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Аспартам є джерелом фенілаланіну! Дієтичну добавку не рекомендовано хворим на фенілкетонурію.

Необхідність застосування в період вагітності та годування груддю визначає лікар індивідуально.

ФОРМА ВИПУСКУ

Таблетки шипучі № 20 в тубі, у картонній коробці

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

роки