

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ДІЄТИЧНОЇ ДОБАВКИ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА

ВЕНОДІОЛ (VENODIOL)

Дієтична добавка.

Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Склад

1 таблетка містить

основні речовини:

діосмін мікронізований ≤ 5 мкм (μm) – 450 мг (mg);

аскорбінова кислота (вітамін С) – 100 мг (mg);

гесперидин – 50 мг (mg);

допоміжні речовини: повідон (*наповнювач*); натрію кроскармелоза (*наповнювач*); магнію стеарат (*наповнювач*); целюлоза мікрокристалічна (*наповнювач*).

Функціональні властивості складових компонентів

ВЕНОДІОЛ – флеботропний продукт (мікронізована очищена фракція флавоноїду діосміну та гесперидину в комбінації з аскорбіновою кислотою), що сприяє прояву комплексної ангіопротекторної та лімфотонізуючої дії, необхідної для системного впливу на порушення венозного та лімфатичного відтоку з нижніх кінцівок. За своєю хімічною будовою діосмін та гесперидин належать до γ -бензопіренів, які є представниками групи біологічно активних речовин – біофлавоноїдів.

Біофлавоноїди – це сполуки, що отримують із рослинної сировини. Всі вони практично малорозчинні у воді, тому погано всмоктуються у шлунково-кишковому тракті. Одним із шляхів покращення всмоктування речовини є зменшення розмірів її часток, що підвищує сумарну площу контакту речовини із слизовою оболонкою шлунково-кишкового тракту і, внаслідок цього, всмоктування. Важливою особливістю ВЕНОДІОЛУ, що відрізняє його від інших веноактивних біофлавоноїдів, є мікронізація діосміну – спеціальна технологічна обробка, що значно зменшує частки активного інгредієнту та забезпечує високу швидкість його всмоктування у шлунково-кишковому тракті. Профілактична концентрація продукту в крові визначається вже через 4 години після прийому.

Аскорбінова кислота (вітамін С), що входить до складу продукту, сприяє покращенню еластичності судин, нормалізації проникності капілярів, нормальному кровотворенню та підвищенню захисних сил організму.

ВЕНОДІОЛ сприяє підвищенню тонуусу вен, і, що надзвичайно важливо, прискоренню лімфатичного транспорту. Стосовно клітинних та молекулярних механізмів цього продукту – важлива його здатність сприяти пригніченню аутоагресивності лейкоцитів та макрофагів, а також блокуванню синтезу місцевих медіаторів запалення.

При систематичному застосуванні ВЕНОДІОЛ сприяє зменшенню вираженості клінічних проявів хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок органічної та функціональної природи.

Рекомендації щодо застосування

У якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біофлавоноїдів, вітаміну С з метою:

- загального зміцнення організму;
- поліпшення імунітету;

- нормалізації венозного і лімфатичного кровообігу в нижніх кінцівках і венах прямої кишки;
- зменшення відчуття важкості в нижніх кінцівках.

Комплекс біологічно активних речовин, що входять до складу ВЕНОДІОЛУ має загальнозміцнюючі, ангіопротекторні та лімфотонізуючі властивості: сприяє підвищенню тонусу та поліпшенню еластичності венозних судин, нормалізації проникності капілярів, прискоренню лімфатичного транспорту, пригніченню аутоагресивності лейкоцитів і макрофагів, а також блокуванню синтезу місцевих медіаторів запалення, нормальному кровотворенню та підвищенню захисних сил організму.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза

Вживати дорослим під час їди.

Таблетки ковтати, не розжовуючи; запивати 1 склянкою (200 мл) питної води.

Можливі два способи прийому:

1 спосіб – по 1 таблетці 2 рази на добу на весь період споживання;

2 спосіб – по 1 таблетці 2 рази на добу перші два тижні, а потім по 2 таблетки 1 раз на добу.

Курс споживання: 2 місяці, далі 2 місяці перерви.

При необхідності курс споживання можна повторити 2-3 рази на рік.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Застереження щодо застосування

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до складових компонентів; виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки в стадії загострення.

Форма випуску

Таблетки у блистерах, №30, 60, 120 у картонній коробці.

Маса 1 таблетки

750 мг (mg) ± 5 %.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.

Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника

УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина (15 Теммуз Махаллеші Джамі Йолу Джаддесі №50 Гюнешлі Багджилар/Стамбул, Туреччина) /

WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC. A.S., Turkey (15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi No:50 Gunesli Bagcilar/Istanbul, Turkey); тел.: + 90 212 474 70 50; + 90 212 474 09 01.

Заявник

УОРЛД МЕДИЦИН ЛІМІТЕД, Велика Британія /
WORLD MEDICINE LIMITED, United Kingdom

Найменування та місцезнаходження і номер телефону імпортера.

Вказано на упаковці.